

# Dr. Link® SPEZIAL-DIÄT

## Leberinsuffizienz | Hepatic

### Huhn und Pute

#### ■ Premium-Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

Speziell entwickelte Premium-Diät für Katzen. Zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz. Aus hochwertigen tierischen Proteinen mit besonders hoher biologischer Wertigkeit und ausgewogenen Nährstoffkomponenten.



Entlastung der Leber



Optimale Verdauung



Aktiver Zellschutz

#### ■ Indikation (Anwendungsgebiete):

- Zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz

#### ■ Kontraindikation (Gegenanzeigen):

- Tragende und laktierende Katzen
- Katzen im Wachstum
- Katzenwelpen nur nach Indikationsstellung durch den behandelnden Tierarzt

#### Ziele der Diät:

Therapieziele sind das Aufrechterhalten der normalen Stoffwechselläufe, der Ausgleich von Elektrolytstörungen, das Vermeiden eines übermäßigen Anfalls von giftigen Stoffwechselprodukten und die Unterstützung der Regeneration der Leberzellen durch die Bereitstellung von Substraten.

#### Diätetische Merkmale:

Hochverdaulich, reizarm – Dr. Link® SPEZIAL-DIÄT Leberinsuffizienz | Hepatic enthält ausgewählte hochverdauliche Proteine und Kohlenhydrate mit optimaler Bioverfügbarkeit.

#### Produktvorteile:

Diese Zusammensetzung entlastet den Verdauungstrakt, reduziert die klinischen Symptome und ermöglicht die Regeneration der Darmmukosa.

#### Begrenzter Proteingehalt:

Moderater Fettgehalt:

#### Entlastung der Leber.

Zur Steigerung der Akzeptanz und der Energiedichte und zur Vermeidung von Problemen bei der Fettverdauung die durch eine eingeschränkte Leberfunktion auftreten können.

#### Hohe Energiedichte:

Leicht verdauliche Kohlenhydrate:

Die hohe Energiedichte ermöglicht die Fütterung von kleinen Mahlzeiten und führt zu Entlastung des Darms.

Komplexe Kohlenhydrate wie Kartoffeln können dazu beitragen, die Aufnahme von Glukose (Blutzucker) aus dem Darm zu verlangsamen. Gleichmäßige Bereitstellung und bessere Ausnutzung der Glukose in der Leber.

#### Erhöhter Faseranteil:

Vitamine mit antioxidativer Wirkung:

Pflanzliche Fasern können die Ausscheidung von Ammoniak und anderen Giftstoffen aus dem Darm fördern und unterdrücken die Produktion von Ammoniak durch die Darmbakterien.

Eine synergistisch wirkende Antioxidantienkombination (Vitamin E und C und Taurin) kann die Körperzellen vor Angriffen aggressiver Stoffwechselprodukte schützen.



Art.-Nr. 1287240

Erhältlich in 85 g-Schalen



4 250499 206735

#### Zusammensetzung:

Huhn (bestehend aus Mägen, Lebern, Fett): 34%, Geflügelbrühe: 44,6%, Pute (bestehend aus Herzen): 15%, Haferflocken: 4%, Mineralstoffe: 1%, Lachsöl: 0,5%, Sonnenblumenöl: 0,5%, Calciumcarbonat

#### Proteinquelle: Huhn, Pute

#### Energiegehalt je 100 g: 0,4 MJ / 99 kcal

#### Analytische Bestandteile:

Protein: 8,3%, Fettgehalt: 6,3%, Rohasche: 2,4%, Rohfaser: 0,5%, Feuchtigkeit: 79%, Omega-6-Fettsäuren: 1%, Omega-3-Fettsäuren: 0,2%, Calcium: 0,29%, Phosphor: 0,19%, Natrium: 0,15%, Kupfer (gesamt): 1,8 mg/kg

#### Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg:

Vitamin D3: 200 I.E., Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 20 mg, Vitamin B1: 10 mg, Vitamin B2: 6 mg, Vitamin B6: 2 mg, Vitamin B12: 75 mcg, Calcium-D-Pantothenat: 9 mg, Folsäure: 0,35 mg, Biotin: 300 mcg, Cholinchlorid: 1.200 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 25 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat): 1 mg, Jod(als Calciumjodat, wasserfrei): 0,75 mg, L-Carnitin: 200 mg, Taurin: 1.500 mg

#### Fütterungsdauer: Zunächst bis zu 6 Monate.

#### Fütterungsempfehlung:

Der individuelle Bedarf variiert je nach Alter, Rasse, Haltungsbedingungen und Aktivität. Für die optimale Verträglichkeit hat es sich bewährt, mehrere kleine, zimmerwarme Mahlzeiten über den Tag verteilt zu füttern. Stellen Sie stets ausreichend sauberes, frisches Trinkwasser bereit. Dose nach Anbruch im Kühlschrank aufbewahren. **Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.**

	Tagesbedarf indoor	Tagesbedarf aktiv
3 kg	110 g - 160 g	ca. 210 g
4 kg	130 g - 190 g	ca. 255 g
5 kg	155 g - 220 g	ca. 300 g
6 kg	175 g - 250 g	ca. 335 g
8 kg	210 g - 305 g	ca. 405 g

#### Wichtige Informationen bei Futterverweigerung:

Inappetente und stark mangelernährte Patienten sollten nötigenfalls frühzeitig zwangs- bzw. sondenernährt und dazu sowie zur Einleitung unterstützender Versorgungsmaßnahmen gegebenenfalls stationär aufgenommen werden. Der frühzeitige Einsatz einer Sondenernährung bei Katzen mit Leberlipidose und anderen anorektischen Leberpatienten ist von entscheidender therapeutischer Bedeutung. Gerade Katzen entwickeln häufig eine erlernte Aversion gegen Futter, welches sie fälschlicherweise mit ihrer Übelkeit in Verbindung bringen. Daher ist die Deckung des Kalorienbedarfs über Sondenernährung sofort nach der Diagnoseerstellung einer Leberlipidose meist mehr zu empfehlen, als verschiedene Futtermittel anzubieten.